

Hoja divulgativa

Guía ilustrativa de la distribución geográfica de algunos genotipos de tacaco (*Sechium tacaco*) en Costa Rica

Illustrative guide to the geographical distribution of some tacaco (*Sechium tacaco*) genotypes in Costa Rica

José Eladio Monge Pérez
Michelle Loría Coto

El tacaco, *Sechium tacaco* (Pittier) C. Jeffrey, es una planta de la familia Cucurbitaceae, originaria de Costa Rica. Es una especie apetecida por sus frutos, que se consumen como verdura.

El cultivo de tacaco se practica preferentemente en zonas con altitudes entre 500 y 1800 sobre el nivel del mar.

En la Figura 1 se muestra la distribución geográfica de los sitios en que se han recolectado algunos genotipos de tacaco en Costa Rica, cuyos frutos en su mayoría son de muy buena calidad. Los sitios de recolección de frutos se concentran sobre las principales cordilleras del país.




Figura 1. Distribución geográfica de algunos genotipos de tacaco en Costa Rica. Cada punto de color morado representa un sitio de recolección de frutos de tacaco.

La información presentada en esta hoja divulgativa se generó en los proyectos de investigación denominados “Mejoramiento genético en tacaco” y “Mejoramiento genético en tacaco. II etapa”, que fueron financiados por la Universidad de Costa Rica.